

# Microdacyn®

sanfer®

## Recomendaciones de expertos para el uso de soluciones de ácido hipocloroso en heridas infectadas

En heridas infectadas se puede tratar con la solución antiséptica **Microdacyn®** a base de ácido hipocloroso (HOCl), por un periodo de 15 minutos intralesional o asegurar que la herida quede cubierta con la solución de HOCl.<sup>1</sup>

La práctica clínica sugiere el uso de **Microdacyn®** en heridas infectadas.

Irrigación de la herida después de cualquier desbridamiento (15 minutos es el tiempo sugerido):

**Cerrar la herida parcialmente e instilar con un catéter.<sup>1</sup>**

Impregnar un apósito y fijarlo a la herida, con cambios de apósito diariamente.<sup>1</sup>



**Cubrir la herida con solución de ácido hipocloroso por 15 minutos después de desbridar la herida.<sup>1</sup>**

 **No es necesario enjuagar<sup>1</sup>**

## Poderosa acción antiséptica



## Microdacyn® Solución

Limpeza y curación de heridas

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.

Microdacyn® Solución Reg. Núm. 1075C2003 SSA. Aviso Publicidad: 2615052002C00021

Referencia: 1. Armstrong DG, Bohn G, Glat P, et al. Expert Recommendations for the Use of Hypochlorous Solution: Science and Clinical Application. *Ostomy Wound Manage.* 2015;61(5):S2-S19.